

[22.05.2002] За последние годы снижается смертность среди населения

...Смертность среди населения страны за последние годы несколько уменьшилась, ее наиболее высокий уровень отмечался в 1994-1995 гг., затем началось плавное снижение.

Согласно международной практике, для расчета средней продолжительности жизни населения строятся специальные таблицы смертности. Источником для разработки данных являются актовые записи о смерти, направляемые в органы государственной статистики.

Анализ таблиц смертности показывает, что чем выше уровень смертности детей в возрасте до 5 лет, тем ниже ожидаемая продолжительность жизни при рождении, и с увеличением возраста средняя продолжительность жизни убывает.

В 2000 г. средняя продолжительность жизни (СПЖ) у мужчин составила 64.9 года, у женщин – 72.4 года, т.е. это среднее число лет, которое предстоит прожить родившимся в данном году при сохранении на протяжении их жизни возрастных интенсивностей смертности, наблюдаемых в этом году.

Разность СПЖ при рождении у мальчиков и девочек составляет 7.5 года; у юношей и девушек в 15-летнем возрасте – 7 лет; у взрослого населения активного рабочего возраста (45 лет) – 5 лет.

Выходя на пенсию, современные женщины имеют вероятность прожить еще 23 года, мужчины – только 16 лет. Это объясняется тем, что смертность мужчин в 1.2-1.4 раза выше смертности женщин.

Главной причиной остаются болезни системы кровообращения – 45% всех умерших. Почти 30% умерших составляют лица трудоспособного возраста, из них 74% – мужчины.

Из общего числа умерших мужчин трудоспособного возраста 29% умерли от сердечно-сосудистых заболеваний и 27% – в результате несчастных случаев, отравлений и травм.

«Аргументы и факты Кыргызстан», №20, май