3.5 Ландшафты

3.5.1 Оценка в категориях значения и чувствительности для рекреационных целей

Основной целевой функцией по отношению к ландшафтам является развитие использования рекреационных ресурсов, ориентированное на экологические формы отдыха, лечения и улучшения социально-экономической сферы территории.

Значение ландшафтов определялось возможностью использования их для различных видов отдыха. Чувствительность ландшафтов определялась потенциальной возможностью возникновения или активизации в первую очередь экзогенных рельефообразующих процессов и явлений, а также деградации биоценозов в результате антропогенной деятельности. Эти процессы затрагивают наиболее динамичные элементы ландшафта и определяют их современное состояние. Активизация эрозионных процессов, а также деградация почвенного покрова вызывается интенсивным использованием территории, часто приводящим к быстрым и необратимым изменениям ландшафтов (табл.15).

Критерии оценки значения ландшафтов

табл.15

-Разнообразие	Определяет количество ландшафтов
	различных типов, распространенных на
	определенной площади

-Контрастность	Учитывает характер сочетаний разнородных ландшафтов, степень расчлененности рельефа;
-Эстетическая привлекательность	Выявляет ландшафты высокой пейзажной выразительности и живописности, их индивидуальный облик
- Рекреационные возможности	Определяет типы отдыха, их специализацию
-Уникальность	Позволяет выявить распространение редких, реликтовых ландшафтов, природных памятников с научно-познавательной ценностью

Оценка чувствительности учитывала реакции биоценозов и литогенной основы ландшафтов, интенсивность и обратимость изменений (табл.16)

Критерии чувствительности

табл.16

Степень	Реакция морфолитогенной и биотической
чувствительности	составляющих ландшафта на антропогенные
	воздействия

высокая	Активизация или возникновение
22.00.10	-оползней, обвалов, лавин, осыпания на очень
	крупных и сильно расчлененных скалистых
	склонах тектонических контактов, абразионных
	уступах оз. Иссык-Куль;
	-мерзлотных процессов в сыртовой зоне и в
	верховьях долин (термокарст, солифлюкция,
	оползни, курумы и т.п.); сильная деградация
	почвенно-растительного покрова;
	-оползней и эрозии на крупных
	слабозадернованных склонах долин, эрозионно-
	аккумулятивной деятельности на поймах и низких
	террасах долин, сильная деградация почвенно-
	растительного покрова ;
средняя	Возникновение или активизация
	-эрозионной деятельности — смыв и перемещение
	крупнообломочного материала на среднекрутых
	склонах хребтов и долин;
	-эрозии и дефляции на сухостепных,
	полупустынных склонах хребтов и долин;
	-дефляции и эрозии, процессов солифлюкции на
	конусах выноса и пашнях на сыртовых равнинах
	зоны многолетней мерзлоты;
низкая	Активизация отсутствует или незначительная
	(выравненные поверхности в высокогорьях
	выравненные вершинные и пологонаклонные
	задернованные склоны среднегорий, предгорно-
	низкогорные слабонаклонные равнины и приозерные
	террасы).
	. 56665.7.

3.5.1.1 Значение ландшафтов

Высокой рекреационной ценностью обладают гляцнальнонивальные ландшафты хребтов с сильным расчленением рельефа, пиками, вершинами, ледниками разных типов, перевалами, контрастностью оледенелых и заснеженных склонов и голых альпийских форм — «бараньих лбов, курчавых скал», курумов и т.д.

Сюда относятся высокогорные и субальпийские луга, среднегорные лесо-лугостепные ландшафты склонов, хребтов и долин, обладающие высокой пейзажной выразительностью и обзорностью. В зоне развития лесных ландшафтов много природных объектов с научно-познавательной ценностью, широко распространены места произрастания эндемичных и редких растений, расселения животных, у нижней границы — выходы теплых и горячих минеральных источников. Здесь множество удобных мест для временных стоянок и отдыха. Кроме того, здесь сосредоточены ягодные и грибные места, а в луговой части — удобные места для пчеловодов.

Высоким рекреационным значением характеризуются сухостепные, полупустынные и пустынные ландшафты западной части предгорно-низкогорной зоны Иссык-Кульской котловины с контрастным и живописным рельефом типа «бедленд», ландшафты береговой зоны оз. Иссык-Куль с песчаными пляжами, зарослями облепихи, буграми БЭРА — в западной части котловины, а также ландшафты с каньонами, горнодолинные водопадами, прирусловыми ельниками, живописными склонами и поймами (долины рек Джеты-Огуз, Чон-Кызыл-Суу, Ак-Суу, Барскоон, Джуука, Джукаучак, Чолпон-Ата, Тюп и Жыргалан — в восточной и средней части котловины, а в западной части — долины рек Тору-Айгыр, с сухостепными и пустынными ландшафтами Typacyy); контрастным рельефом, живописными обнажениями в палеоогенпородах, троговые неогеновых долины с интегральными ландшафтами болот, моренными озерами.

Среднезначимые ландшафты характерны для тундровой зоны с холмисто- моренным рельефом, холодным климатом, а также предгорно-низкогорных лугостепных, сухостепных, полупустынных частей склонов хребтов, местами крутосклонных и овражистых; здесь ландшафты менее выразительны и живописны, часто встречаются нарушенные ландшафты.

Низкозначимые ландшафты приурочены к предгорнонизкогорному поясу сухих степей, полупустынь и пустынь, с сильно расчлененным рельефом, изреженной растительностью, это

обычно труднопроходимые места. К этой же категории можно отнести маловыразительные ландшафты подгорных равнин с пустынями и полупустынями в западной части котловины, сухостепные и степные — в средней и восточной ее частях. Сюда же относятся однообразные и унылые галечниковые русла рек и высокогорные сырты.

3.5.1.2 Чувствительность ландшафтов.

Высокочувствительные ландшафты расположены в гляциальнонивальной и тундровой зоне с ледниками, скалами, вершинами, крутыми склонами, где велика опасность катастрофических процессов и явлений:

- -на крутых луговых и степных склонах альпийского пояса (до 35°),
- -на крутых (до 35°) залесенных и закустаренных склонах, (в основном луговые, рябиновые ельники и елово-арчовые леса),
- -на пойменных и надпойменных террасах с активными мерзлотными процессами,
- -на дне каньонообразных и v-образных крутонаклонных (> 35°) долин, с отвальными и ссыпными крутыми и отвесными склонами, сложенными грубообломочным аллювием и валунами руслами,
- -в береговой зоне оз. Иссык-Куль, где распространены заросли облепихи и другие кустарники, абразионные уступы, заболоченные участки,

Гляциально-нивальные ландшафты с ледниками, цирками, карами и т.п. распространены в пригребневой зоне хребта Кюнгей-Алатоо и Тескей Алатоо — в восточной и средней их части, в бассейне р. Сары-Джаз — крупные узлы оледенения с известными во всем мире пиками (Хан-Тенгри и др.), в бассейне р. Инылчек, в массиве Ак-Шийрак; ледники плоских вершин хр. Тескей Алатоо, хр. Кокшаал и его отрогов. Ниже них располагается зона с моренными и завальными озерами. Крутые залесенные склоны можно встретить в любой долине хребтов Тескей и Кунгей Алатоо (р.р. Тюп, Жыргалан, Ак-Суу, Сары-Джаз, Койлу). Здесь локально распространены участки обрывистых обвально-ссыпных склонов и зон тектонических контактов. Мерзлотные комплексы распространены в верхних частях всех троговых долин и в сыртовой зоне в долинах рек Ара-Бель и Кумтор, Закустаренная береговая зона оз. Иссык-Куль с

барбарисом, шиповником и в основном облепихой — фрагментарно по периметру озера — на эоловых частях полуостровов Ананьевский, Сухой Хребет, Кара-Булун, Тору-Айгыр, Туура-Суу, Чолпон-Ата и по выровненному южному берегу, где сосредоточены участки болот — Ак-Улей, Ордек-Учар, Тура-Суу, местами в дельтовой части долин рек Тюп, Жыргалан, Каракал, Джеты-Огуз и др.

Среднечувствительные ландшафты охватывают:

- -холмисто-моренные днища сыртовой зоны с развитием криогенных процессов, с криогенными подушечками;
- -приводораздельные поверхности отрогов основных хребтов, крутые и среднекрутые (до 30-35°) склоны с альпийскими и субальпийскими лугами и лугостепями,
- -покатые залесенные склоны хребтов и долин;
- -крутые (до 35°) закустаренные лугостепные и степные предгорья и низкогорья, холмисто-увалистые закустаренные лугостепные предгорья,
- -средние и нижние части речных долин в пределах Иссык-Кульской котловины (1400 2000м), где чувствительность ландшафтов определяется возможностью развития линейной эрозии и деградацией тугайных лесов (р. Тюп, Жыргалан и др.), средняя и верхняя части долины р. Чон-Кызыл-Суу (хр. Кунгей Алатоо), где чувствительность ландшафтов определяется развитием селевых процессов и прорывом обвальных озер и сопровождается деградацией прирусловых ельников.

Низкочувствительные ландшафты включают:

- -покатые залесенные и закустаренные склоны среднегорий и предгорий. Из ельников сюда можно отнести моховые тенстравные. Они приурочены к покатым (3-6°) склонам долин, где интенсивность экзогенных рельефообразующих процессов наименьшая, а особенности рельефа допускают использование этих участков без защитных мер. Наибольшее распространение данные ландшафта имеют по всему горному обрамлению Иссык- Кульской котловины и местами в долине р. Койлу, в бассейнах рек Жыргалан, Тюп.
- -береговая пляжная зона оз. Иссык-Куль за исключением дельтовых участков, заросли облепихи и заболоченностей,
- -террасовые долины с незаболоченными поймами тугайных лесов.